

Redakčná rada:

Doc. RNDr. Ladislav Jedlička, CSc. - hlavný redaktor.

Viera Stloukalová, PhD. - výkonný redaktor; Mgr. Peter Fend'a; Doc. Ing. Pavel

Hrubík, DrSc.; RNDr. Iľja Okáli, CSc.; RNDr. Mirko Slovák, CSc.

Príspevky zasielajte na adresu:

Viera Stloukalová, PhD.

Katedra zoológie PriF UK,

Mlynská dolina, B - 1.

842 15 Bratislava

Distribúcia: - členovia SES dostávajú časopis automaticky
- Slovensko (nečlenovia a inštitúcie) a zahraničie okrem ČR:

RNDr. Ondrej Šauša, CSc.

H. Meličkovej 6/71

841 05 Bratislava

- Česká republika:

ENTO-TERA

Vladimír Malý a spol.

P. O. Box 27

128 00 Praha 2

Česká republika

NĚKTERÉ NEPUBLIKOVANÉ ÚDAJE O ARACHNOFAUNĚ SLOVENSKA.

Jan BUCHAR

Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Viničná 7, 128 44 Praha 2

BUCHAR, J.: Some unpublished data of Slovakian spiders (Araneae). *Entomofauna carpathica*, 11: 33-42.

Abstract: Hitherto unpublished faunistic data of 51 species of lycosid spiders and of 105 rare species of some other spider families are presented in this paper. 47 visited Slovakian localities are mapped and their ordinal numerals express the occurrence of the collected species.

Key words: Slovakia, Lycosidae, less common species of spiders, faunistics.

ÚVOD

Již delší dobu se chystám opublikovat faunistická data o arachnofauně Slovenska, která jsem získal jednak během vlastních několika sběracích exkurzí, jednak v podobě cenných úlovků od četných přátel arachnologie (viz přehled lokalit a poděkování). Rád jsem touto cestou vyhověl i přání milého kolegy RNDr. Petra Gajdoše, CSc., z Arachnologické sekce Slovenské entomologické společnosti, který se zabývá spolu s dalšími spolupracovníky analýzou rozsáhlého arachnologického materiálu zaměřenou na globální hodnocení přírodních poměrů Slovenska (GAJDOŠ & SLOBODA 1995). Věřím, že předložená data budou užitečná, jak pro porovnání s nejnovějšími sběry, tak pro orientaci při sledování dlouhodobějšího vývoje přírodních poměrů na Slovensku.

Zvláštní pozornost je zde věnována bioindikačně významné čeledi Lycosidae, jejíž sběr jsem obzvláště preferoval.

METODIKA A MATERIÁL

Níže shromážděná faunistická data o 51 druhu čeledi Lycosidae a 105 méně hojných druzích některých dalších čeledí byla získána v letech 1959 až 1993 běžnými sběracími metodami (především individuálním sběrem do ruky, ale i metodou smýkání, sklepávání a prosevu lesní podestýlky, zcela výjimečně i metodou formalinových pastí). Na sběru sa podílelo 14 zoologů a v některých případech spolu s autorem i technická asistentka E. Laštovková, ale i další účastníci krátkodobých sběracích exkurzí organizovaných naší katedrou.

Nejprve následuje seznam 47 navštívených lokalit (viz mapa, na níž jsou lokality vyznačeny pořadovými čísly). U každé z nich je uveden kód mapovací sítě DFS, způsob sběru, sběratel (pokud není uvedeno jeho jméno, byl materiál sbírán autorem). Pokud byla lokalita navštívena vícekrát, nebo bylo sbíráno na různých biotopech, jsou tyto alternativy rozlišeny pomocí malých písmen abecedy.

1. Devínska Kobyla (7867, 7868), Vápencová skalní step:
 - a) 7.7.1985.
 - b) 10.3.1991. lg. Hovorka
 - c) 11.5.1993. lg. Palice
2. Ložorno (7668), 12.5.1964:
 - a) okraj borového lesa
 - b) břehy odvodňovacího kanálu
 - c) duna řídce porostlá akáty a borovičkami
 - d) vlhká lesní paseka
3. Vlčkovce u Trnavy (7671), smýkání, 15.5.1991. lg. Kocián
4. Hlohovec (7572), smýkání, 13.6.1991. lg. Kocián
5. Piešťany (7472-73, 7572-73), VIII.1993. sběr na *Verbascum thapsiforme*. lg. Kunert
6. Čachtice (7272), skalní step pod hradem, 28.6.1968. lg. Bílý
7. Trenčín (7174), 28.6.1968. lg. Bílý
8. Malá Fatra, Fačkov (6977), břeh potoka, 29.7.1983. lg. Štys
9. Malá Fatra, Strečno (6879), kamenitý břeh Váhu, 31.7.1962. lg. Húrka
10. Malá Fatra (6880):
 - a) Veľký Kriváň, vrcholové partie, 1.9.1964
 - b) Turany, pobřeží Váhu, 31.7.1962.
11. Nitra, Zobor (7674):
 - a) prosev lesní opadanky, 13.6.1962. lg. Kunstě
 - b) skalní step, sběr pod kameny, 30.6.1966
 - c) skalní step, sběr, 14.10.1992
12. Čenkov (8277):
 - a) stepní rezervace, 24.6.1960. lg. Žďárek
 - b) stepní rezervace, VI.1962. lg. Kunst
 - c) stepní rezervace, 13.5.1964
 - d) les přiléhající k rezervaci, 13.5.1964
 - e) stepní rezervace, 17.2.1975. lg. Vilimová
13. Kamenínske slanisko (8177):
 - a) individuální sběr, 13.5.1964
 - b) individuální sběr, 13.9.1974. lg. Vilimová
14. Kamenica n. Hronom (8178):
 - a) lesostep, 15.4.1959. lg. Verner
 - b) sběr na pastvině, 13.5.1964
 - c-f) sběr formalinovými pastmi, 13.5.-18.6.1964:
 - c) skalní sráz nad silnicí
 - d) dolní část pastviny
 - e) okraj (mezitím vypálené) lesostepi
 - f) lesostep na vrcholu
 - g) sběr na lesostepi, VI. 1962. lg. Kunst
 - h) sběr na pastvině, 18.6.1964
 - i) 17.9.1965
 - j) 19.4.1971. lg. Bílý
 - k) Chľaba, 16.2.1976. lg. Vilimová
 - l) smyk na lesostepi, VI. 1991. lg. Kocián
 - m) Štúrovo, protipovodňový násyp na břehu Dunaje, 14.5.1993. lg. Palice
15. Beľá (8077), břeh Hronu, 21.10.1977. lg. Štusák
16. Šahy-Magas (7979), sběr na lesostepi, 14.5.1964
17. Dudince (7879), téměř vyschlé koryto potoka, sběr mezi kameny, 3.5.1980. lg. Pultar
18. Pótor (7782), jižní okraj dubového lesa, 14.5.1964
19. Filákov (7784), 12.6.1973. lg. Bílý
20. Zvolen (7480), 18.5.1993:
 - a) Kováčová, hospodářská krajina,

- b) Kováčová, okraj dubového lesa,
- c) Javorie, smíšený listnatý les.
21. Zámotie (7182), kamenitý břeh Hronu, 18.5.1964
22. Nízke Tatry (7083-84), cesta od Čertovice pod jižní svah Ďumbieru, 23.8.1967
23. Liptovský Hrádok (6984), pobřeží Váhu, lg. Frankenger
24. Vysoké Tatry (6886), individuální sběr:
 - a) Furkotská dolina, 14.9.1970
 - b) Kriváň, vrcholová oblast, 19.9.1970
 - c) Važecká dolina, 19.9.1970
 - d) Malá Studená dolina, nad hranicí lesa, 10.8.1974
25. Vysoké Tatry (6787), individuální sběr:
26. Červený Kláštor (6688), břeh Dunajce, 30.7.1977
27. Domica (7588), skalní step, 28.5.1959
28. Hrušov (7489), lesostep nad osadou, 13.7.1985
29. Zádiel (7391):
 - a) ústí kaňonu, 16.5.1964
 - b) výstup na východní plato, jižně exponované lesní světliny, 16.5.1964
 - c) východní plato, lesostepní biotopy, sběr, 16.5.1964
 - d) východní plato, lesostepní biotopy, smyk, 16.5.1964
 - e) individuální sběr, 19.2.1976 lg. Vilimová
 - f) Turňa, sběr na skalní stepi pod hradem, 16.5.1964
30. Muráň (7286), 17.5.1964:
 - a) louka pod lesem
 - b) bučina, sběr
 - c) bučina, prosev
 - d) bučina, smyk podrostu
 - e) sběr na lesním palouku
 - f) kamenitý břeh potoka.
31. Slovenské Rudohorie, Klenovský Vepor (7289), potůček v Čierné dolině, 18.5.1994
32. Stratená (7188), lesní kamenité biotopy, 10.7.1985
33. Nízke Tatry (7087), Zadná Hôla, 3.9.1964
34. Novoveská Huta (7089), skládka palivového dřeva u cesty, 3.8.1988
35. Povodí Bodrogu (7696):
 - a) Veľký Kamenec, výstup na kopec, 8.6.1960
 - b) Tajba, pobřeží mrtvého ramene Bodrogu, 8.6.1960
36. Malé Trakany (7698), 10.3.1966:
 - a) rozpraskaný hlinitopísčité břeh Tisy
 - b) sběr pod kameny
 - c) sběr pod náplavem.
37. Somotor (7596):
 - a) sběr pod kameny v lomu, 11.3.1963
 - b) sběr na písčinych dunách, 9.6.1960
38. Kráľovský Chlmec (7597), jižní svahy vrchu Vysoká 10.6.1960
39. Leles (7598), 6.-10.6.1960:
 - a) pastvina
 - b) písčité břehy Latorice
 - c) okolí tůněk na pastvině
 - d) lužní les, smyk
 - e) lužní les, prosev
40. Zemplínska Šírava (7297), sběr na parníku, 15.8.1974
41. Brekov, skalní step pod hradem (7196), 7.7.1962
42. Brekov, oblázkový břeh Laborce na opačné straně řeky (7197), 7.7.1962
43. Humenné (7097):
 - a) břeh Laborce, VII. 1961

- b) kamenitý břeh potoka, 15.8.1974
 44. Snina (7098), oblázkový břeh Cirochy:
 a) 3.7.1962
 b) 6.7.1962
 c) 15.8.1974

45. Sninský kameň (7099), cesta lesem od Morského oka, 6.7.1962.

46. Stakčín (6999), oblázkový břeh Cirochy, 11.7.1961

47. Nová Sedlica (6901), 7.-11.7.1961 a 4.-5.7.1962:

- a) Hlboký potok a jeho přítoky
 b) Stučica, její přítoky a okolní bučiny
 c) Stučica, lesní cesta
 d) Stučica, vlhký mech
 e) Stučica, oblázkový břeh
 f) N. Sedlica, remízky v okolí osady
 g) potok Roztoka, 360-450m.

VLASTNÍ PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ

Nejprve jsou uvedeny relativně kompletnější údaje o čeledi Lycosidae a teprve potom druhy ostatních čeledí seřazených podle mezinárodně platného pořadí. Za pořadovým číslem lokality, uvedeno dvojtečkou, následuje počet samic (♀), samců (♂), subadultních jedinců (sa; subadult specimen) nebo zcela mladých, ovšem druhově determinovatelných nymf (juv.; immature specimen), u samic odchycených i s kokonem je uvedeno (k; egg sac).

Lycosidae

- Acantholycosa lignaria* (CLERCK, 1757) - 32: 1♀, 1 juv., 34: 1♂, 45: 1♀(k), 1♂.
Alopecosa accentuata (LATREILLE, 1817) - 14c: 1♀, 16: 1♀(k), 4♀, 9♂, 29b: 1♂, 29c: 2♀, 6♂, 38: 6♀, 41: 1♀.
Alopecosa cuneata (CLERCK, 1757) - 2b: 2♀, 8♂, 12d: 5♀, 2♂, 14e: 3♀, 1♂, 29c: 2♀, 3♂, 30a: 1♂, 30e: 2♀, 1♂, 35a: 1♀, 39a: 1♀, 41: 1♀.
Alopecosa cursor (HAHN, 1831) - 12c: 5♀, 6♂, 12d: 1♀, 14c: 2♂, 14d: 2♂, 14e: 1♂.
Alopecosa mariaae (DAHL, 1908) - 14g: 2♀, 14k: 1♀, 38: 3♀.
Alopecosa pinetorum (THORELL, 1856) - 23 1♀, 25h: 1♀.
Alopecosa pulverulenta (CLERCK, 1757) - 10a: 1♀.
Alopecosa schmidtii (HAHN, 1835) - 12b: 1♀, 14i: 1♂, 37b: 1♀.
Alopecosa solitaria (HERMAN, 1879) - 14c: 1♀, 14e: 1♀, 27: 1♀, 29c: 1♀, 35a: 1♀.
Alopecosa sulzeri (PAVESI, 1873) - 12d: 1♂, 14b: 1♂, 14e: 1♀, 60♂, 14f: 1♀, 30♂, 27: 1♂, 28: 1♀, 29b: 2♀, 38: 1♀.
Alopecosa trabalis (CLERCK, 1757) - 27: 1♂.
Arctosa cinerea (FABRICIUS, 1777) - 42: 3♀, 44a: 1♀, 44b: 1♀, 44c: 1♀, 1♂, 46: 1♀.
Arctosa leopardus (SUNDEVALL, 1833) - 2b: 5♂, 10b: 1♂, 39a: 1♀, 39b: 1♂, 39c: 1♀, 42: 1♀.
Arctosa maculata (HAHN, 1822) - 17: 1♀, 31: 1♀, 36a: 1♀, 1♂, 47a: 9♀, 2♂, 47e: 1♀, 1♂, 47g: 1♀.
Arctosa stigmatica (THORELL, 1875) - 36a: 4♀, 42: 2♀, 1♂.
Aulonia albimana (WALCKENAER, 1805) - 2d: 1♂, 14e: 2♂, 16: 1♂, 35a: 1♀, 41: 1♀, 47e: 1♀.
Lycosa radiata LATREILLE, 1817 - 2c: 1 juv., 11b: 2 sa, 14b: 3 juv., 14c: 1 juv., 16: 15 juv., 27: 3 juv.

- Lycosa singoriensis* (LAXMANN, 1870) - 39b: 1♀.
Lycosa vultuosa C. L. KOCH, 1839 - 14i: 1 sa.
Pardosa agrestis (WESTRING, 1862) - 2b: 1♀, 1♂, 37a: 1♀.
Pardosa agricola (THORELL, 1856) - 9: 1♀.
Pardosa alacris (C. L. KOCH, 1833) - 20c: 2♂.
Pardosa albatula (ROEWER, 1951) - 25f: 2♀, 1♂.
Pardosa amentata (CLERCK, 1757) - 2b: 1♂, 13a: 5♀, 2♂, 20a: 5♀, 5♂, 21: 10♀, 10♂, 30f: 1♂, 34: 3♀, 39b: 1♂, 43a: 2♀, 1♂, 43b: 1♂, 44a: 1♀(k), 45: 1♀, 47b: 1♀, 47c: 1♀, 47d: 3♀(k), 1♂, 47f: 1♀, 47g: 1♀.
Pardosa bifasciata (C. L. KOCH, 1834) - 14c: 1♂, 27: 1sa.
Pardosa ferruginea (L. KOCH, 1870) - 25b: 1♀, 1♂, 25c: 1♀, 1♂.
Pardosa hortensis (THORELL, 1872) - 14e: 1♂, 18: 6♀(k), 2♂, 20a: 1♀(k), 20b: 6♀, 27: 10♀, 12♂, 28: 10♀(10k, 5 parazitováno), 29b: 1♀, 30a: 13♀, 3♂, 35a: 1♀, 38: 1♀, 41: 1♀, 45: 1♀.
Pardosa lugubris (WALCKENAER, 1802) - 20c: 1♀, 8♂, 25d: 1♀.
Pardosa monticola (CLERCK, 1757) - 12c: 1♂, 20a: 1♂, 27: 1♀, 3♂, 29c: 4♀, 20♂, 30a: 2♀, 7♂, 30e: 2♀, 1♂, 41: 1♀, 1♂.
Pardosa morosa (L. KOCH, 1870) - 8: 2 juv., 21: 1♀, 30f: 3♀(k), 47a: 3♀, 47b: 2♀(k), 47g: 17♀(k), 1♂.
Pardosa nebulosa (THORELL, 1872) - 15: 3 juv., 39b: 1♀.
Pardosa nigra C. L. KOCH, 1834 - 22: nenalezena, 24a: 1♀(s mládřaty), 1sa, 25b: 1♀, 1♂, 25g: 3♀.
Pardosa paludicola (CLERCK, 1757) - 20a: 1♀.
Pardosa palustris (LINNÉ, 1758) - 10a: 7♀, 13a: 3♀, 5♂, 20a: 5♀, 5♂, 27: 1♀, 30a: 12♀, 10♂, 30e: 1♀, 37a: 1♀, 39a: 1♀, 41: 5♀, 1♂, 47c: 1♀.
Pardosa prativaga (L. KOCH, 1870) - 39a: 1♂, 42: 1♂.
Pardosa pullata (CLERCK, 1757) - 2b: 3♀, 13♂, 2d: 5♀, 11♂, 20a: 1♀, 25c: 2♂, 33: 1♀, 39c: 1♀.
Pardosa riparia (C. L. KOCH, 1833) - 25c: 1♂, 25d: 1♀, 1♂, 27: 1♂, 30e: 1♀, 33: 3♀, 37a: 1♀, 47f: 1♀.
Pardosa saltuaria (L. KOCH, 1870) - 10a: 11♀, 22: 25♀, 24b: 2♀, 25b: 1♀, 1♂, 25g: 16♀(k), 33: 3♀.
Pardosa sordidata (THORELL, 1875) - 25c: 1♂, 25f: 2♂.
Pardosa wagleri (HAHN, 18N22) - 10b: 2♂, 26: 1♀, 42: 2♀, 43a: 4♂, 44a: 1♂, 44b: 1♀, 44c: 1♀, 46: 3♀, 1♂, 47a: 1♀.
Pirata hygrophilus THORELL, 1872 - 2d: 1♀, 3♂, 21: 1♀, 24d: 1♀, 31: 2♂, 39c: 1♀, 1♂, 47b: 1♀, 1♂, 47c: 3♀, 47d: 2♀(k).
Pirata knorri (SCOPOLI, 1763) - 21: 3♀, 24d: 32♀, 1♂, 45: 1♀, 47e: 3♀, 47g: 11♀.
Pirata latitans (BLACKWALL, 1841) - 2b: 4♀, 1♂, 39b: 7♀, 1♂, 42: 1♀.
Pirata piraticus (CLERCK, 1757) - 39c: 1♀, 43a: 2♀.
Pirata piscatorius (CLERCK, 1757) - 39c: 2♀.
Pirata tenuitarsis SIMON, 1876 - 2b: 1♀, 1♂.
Trochosa robusta (SIMON, 1876) - 14e: 1♀, 27: 1♂, 29b: 1♀, 35a: 1♀.
Trochosa ruficola (DEGEER, 1778) - 14c: 1♀, 21: 3♀, 36b: 6♀, 1♂, 36c: 5♀, 1♂, 39b: 1♂, 39c: 1♀, 44b: 2♀, 1♂, 47g: 1♀.
Trochosa terricola THORELL, 1856 - 14e: 1♀, 24c: 1♀, 47d: 1♀.
Xerolycosa miniata (C. L. KOCH, 1834) - 2c: 1♂, 37a: 1f, 38: 1f, 39a: 4♀, 2♂, 39b: 1♂, 41: 1♀.

Xerolycosa nemoralis (WESTRING, 1861) - 20c: 2♀, 25c: 1♀, 25d: 1♀, 1♂, 45: 1♀, 1♂, 47b: 1♀, 47c: 4♀, 4♂

Atypidae

Atypus muralis BERTKAU, 1890 - 1b: 1♂

Dysderidae

Dysdera erythrina (WALCKENAER, 1802) - 14f: 1♂, 30c: 1♂

Mimetidae

Ero apha (WALCKENAER, 1802) - 39d: 1♀

Eresidae

Eresus cinnaberinus (OLIVIER, 1789) - 14l: 1 juv., 35a: 1♀

Uloboridae

Uloborus walckenaerius (LATREILLE, 1806) - 12a: 2♀, 2♂, 12c: 1sa

Theridiidae

Dipoena melanogaster (C. L. KOCH, 1837) - 29e: 1♂

Steatoda albomaculata (DE GEER, 1778) - 12c: 1♀

Theridion nigrovariegatum SIMON, 1873 - 14h: 1♂, 38: 1♂

Linyphiidae

Bohyphantes alticeps (SUNDEVALL, 1833) - 24a: 1♀, 1♂

Ceratinella scabrosa (O. P. CAMBRIDGE, 1871) - 11a: 1♀

Entelecara acuminata (WIDER, 1834) - 29d: 2♂

Prinerigone vagans (AUDOUIN, 1827) - 36a: 1♂

Lepthyphantes insignis O. P. CAMBRIDGE, 1913 - 14f: 1♂

Lepthyphantes keyserlingi (AUSSERER, 1867) - 28: 1♀

Lepthyphantes quadrimaculatus KULCZYNSKI, 1896 - 14c: 2♀, 14d: 2♀, 14e: 1♀

Neriene peltata (WIDER, 1834) - 39d: 1♀

Panamomops fagei MILLER et KRATOCHVIL, 1939 - 30c: 22♀, 16♂

Mecynargus morulus (O. P. CAMBRIDGE, 1873) - 22: 1♀

Scotinotylus antennatus (O. P. CAMBRIDGE, 1875) - 25g: 1♂

Tiso aestivus (L. KOCH, 1872) - 24b: 1♂

Trichoncus hackmani MILLIDGE, 1956 - 12c: 1♂, 30c: 1♂

Troxochrus scabriculus (WESTRING, 1851) - 36a: 1♀, 1♂

Tetragnathidae

Zygiella montana (C. L. KOCH, 1839) - 25e: 1♂

Araneidae

Agelenatea redii (SCOPOLI, 1763) - 14j: 1♀, 16: 1♂

Araneus angulatus CLERCK, 1757 - 7: 1♀

Araneus grossus (C. L. KOCH, 1844) - 6: 1♀

Araniella alpica (L. KOCH, 1869) - 30d: 1♂

Argiope bruennichi (SCOPOLI, 1772) - 43a: 1sa

Gibbaranea bituberculata (WALCKENAER, 1802) - 12c: 1♀, 1♂, 12d: 1♀, 1♂, 14i: 2♀

Hypsosinga albovittata (WESTRING, 1851) - 27: 1♀, 1♂

Hypsosinga sanguinea (C. L. KOCH, 1844) - 16: 2♀, 29e: 1♂

Larinioides folium (SCHRANK, 1803) - 5: 1♀

Larinioides ixobolus (THORELL, 1873) - 40: 1♂

Larinioides patagiatus (CLERCK, 1757) - 35b: 1♀

Pisauridae

Dolomedes fimbriatus (CLERCK, 1757) - 2b: 1 juv., 39c: 1♀

Oxvopidae

Oxyopes lineatus LATREILLE, 1806 - 14c: 1♀

Cybaeidae

Argyroneta aquatica (CLERCK, 1757) - 39c: 1sa

Hahniidae

Antistea elegans (BLACKWALL, 1841) - 2b: 1♀

Hahnina montana (BLACKWALL, 1841) - 10a: 1♂

Hahnina nava (BLACKWALL, 1841) - 12e: 2♀, 14c: 1♂, 29f: 1♀

Hahnina ononidum SIMON, 1875 - 30c: 3♀, 1♂, 39e: 2♀

Dictynidae

Dictyna latens (FABRICIUS, 1775) - 35b: 2♀

Nigma flavescens (WALCKENAER, 1830) - 30d: 1♀, 1♂

Amaurobiidae

Coelotes atropos (WALCKENAER, 1830) - 10a: 7♀, 1♂, 25g: 1♀, 30b: 12♀, 31: 1♀, 33: 1♀

Coelotes longispinus KULCZYNSKI, 1897 - 14f: 1♀

Titanoecidae

Titanoeca quadriguttata (HAHN, 1833) - 14f: 1♂, 28: 1♀

Titanoeca schineri (L. KOCH, 1872) - 37a: 1♀, 37b: 3sa

Titanoeca veteranica HERMAN, 1879 - 14d: 1♂

Liocranidae

Agroacina striata (KULCZYNSKI, 1882) - 44b: 1♀

Phrurolithus pullatus KULCZYNSKI, 1897 - 29f: 3♀, 1♂

Phrurolithus szilyi HERMAN, 1879 - 14f: 1♂

Clubionidae

Clubiona alpicola KULCZYNSKI, 1882 - 10a: 1♂, 24a: 1♀, 24b: 2♀

Clubiona comita C. L. KOCH, 1839 - 14a: 1♂, 18: 1♀, 29a: 1♂

Clubiona frutetorum L. KOCH, 1867 - 25a: 1♂

Gnaphosidae

Callilepis nocturna (LINNAEUS, 1758) - 14m: 1♀, 29e: 1♀

Callilepis schuszeri (HERMAN, 1879) - 14f: 10♂, 18: 1♀, 29b: 2♂

Drassyllus praeficus (L. KOCH, 1866) - 14e: 2♀, 14f: 1♂, 28: 1♀

Drassyllus villicus (THORELL, 1875) - 14e: 6♀, 21♂, 14f: 4♀, 8♂

Gnaphosa lucifuga (WALCKENAER, 1802) - 19: 1 ♀, 29b: 1 ♀
Gnaphosa opaca HERMAN, 1879 - 14f: 2 ♂, 27: 1 ♀, 2 ♂
Haplodrassus kulczynskii LOHMANDER, 1942 - 35a: 1 ♀
Micaria formicaria (SUNDEVALL, 1832) - 28: 1 ♂
Nomisia exornata (C. L. KOCH, 1839) - 14c: 1 ♂
Trachyzelotes pedestris (C. L. KOCH, 1837) - 1a: 1 ♀, 14f: 1 ♀
Zelotes apricorum (L. KOCH, 1876) - 14e: 1 ♀, 12 ♂, 28: 1 ♀
Zelotes aurantiacus MILLER, 1967 - 14f: 6 ♀, 10 ♂
Zelotes declinans (KULCZYNSKI, 1897) - 14e: 2 ♂
Zelotes gracilis (CANESTRINI, 1868) - 14c: 1 ♀
Zelotes hermani (CHYZER, 1878) - 27: 1 ♀, 29f: 6 ♀

Zoridae

Zora manicata SIMON, 1878 - 14e: 1 ♀
Zora nemoralis (BLACKWALL, 1861) - 30b: 2 ♀, 2 ♂
Zora pardalis SIMON, 1878 - 12a: 1 ♂, 27: 1 ♀

Philodromidae

Philodromus fuscomarginatus (DE GEER, 1778) - 2a: 2 ♂
Philodromus margaritatus (CLERCK, 1757) - 30d: 1 ♂ (právě svlečený).
Philodromus vagulus SIMON, 1875 - 24d: 1 ♀, 25a: 1 ♀
Thanatus arenarius THORELL, 1872 - 2c: 1 ♀, 12a: 2 ♀, 14e: 8 ♂, 27: 1 ♂, 37a: 1 ♀
Thanatus formicinus (CLERCK, 1757) - 16: 2 ♀
Thanatus striatus C. L. KOCH, 1845 - 1a: 1 ♂
Thanatus vulgaris SIMON, 1870 - 14c: 1 ♂

Thomisidae

Coriarachne depressa (C. L. KOCH, 1837) - 29e: 1 juv.
Misumenops tricuspidatus (FABRICIUS, 1775) - 14h: 1 ♀, 39d: 1 ♂
Synaema globosum (FABRICIUS, 1775) - 39b: 1 ♀, 39d: 1 ♀
Thomisus onustus WALCKENAER, 1806 - 1c: 1 ♀, 14i: 2 ♀, 29e: 1 ♀, 37a: 1 ♀
Tmarus piger (WALCKENAER, 1802) - 12d: 1 ♂, 20c: 1 ♀, 38: 1 ♂
Xysticus acerbus THORELL, 1872 - 14g: 1 ♀
Xysticus lanio (C. L. KOCH, 1835) - 30b: 1 ♂, 39d: 1 ♀
Xysticus luctator L. KOCH, 1870 - 14f: 5 ♂, 30b: 1 ♂
Xysticus striatipes L. KOCH, 1870 - 14b: 1 ♀
Xysticus marmoratus THORELL, 1875 - 11c: 1 ♀

Salticidae

Carrhotus xanthogramma (LATREILLE, 1819) - 3: 1 ♀
Chalcoscirtus pseudoinfimus OVTSHARENKO, 1978 - 14b: 1 ♂
Euophrys obsoleta SIMON, 1868 - 27: 1 ♀, 29b: 3 ♀, 7 ♂, 29e: 2 ♂, 29f: 3 ♀, 1 ♂
Heliophanus flavipes (HAHN, 1832) - 4: 2 ♀
Macroeris nidicolens (WALCKENAER, 1802) - 29d: 1 ♂
Marpissa muscosa (CLERCK, 1757) - 12d: 1 ♂, 14j: 1 ♂, 18: 1 ♀
Marpissa nivoyi (LUCAS, 1846) - 3: 2 sa
Myrmarachne formicaria (DEGEER, 1778) - 13b: 1 juv., 39c: 1 ♀
Neon reticulatus (BLACKWALL, 1853) - 39e: 1 ♀, 1 ♂
Pellenes nigrociliatus (L. KOCH, 1875) - 1a: 1 ♀

Pellenes tripunctatus (WALCKENAER, 1802) - 4: 1 ♀, 14: 1 ♀, 16: 1 ♂, 30e: 1 ♂
Philaeus chrysops (PODA, 1761) - 29e: 2 juv., 29f: 1 ♂ (právě svlečený)
Pseudicius encarpatus (WALCKENAER, 1802) - 12d: 1 ♀
Sitticus rupicola (C. L. KOCH, 1837) - 32: 1 ♀
Sitticus zimmermanni (SIMON, 1877) - 12a: 1 ♂
Synageles hilarulus (C. L. KOCH, 1846) - 14: 1 ♀

VÝSLEDKY A DISKUSE

Přestože byly do předložené práce vybrány, dle mých vlastních představ „méně hojně druhy“, nasbírané na území Slovenska, věřím, že tento výběr nebude chápán jinak, než jako subjektivní kritérium ovlivněné především dlouhodobým studiem arachnofauny Čech. V podstatě jde o pouhý příspěvek k rozsáhlým arachnologickým sběrům uskutečňovaným ve velkém rozsahu pod vedením RNDr. P. Gajdoše a Mgr. J. Svatoně. Přesto lze říci, že uvedený soubor obsahuje řadu významných druhů klasifikovaných v červeném seznamu pavouků Slovenska (GAJDOŠ & SVATONĚ 1993): ve 30 případech jako druhy vzácné, 17 jako druhy zranitelné, 7 jako ohrožené a jeden jako vyhynulý (*Arctosa stigmosa*). Kromě toho předložený seznam obsahuje řadu údajů fenologických: např. datum výskytu velice mladé nymfy druhu *E. cinnaberinus* v materiálu získaném metodou smýků na vegetaci, který s velikou pravděpodobností souvisí s málo známou aeronautickou činností tohoto druhu.

SOUHRN


V předložené práci jsou obsaženy údaje o 51 druhu čeledi Lycosidae a o 104 vzácnějších druzích některých zbývajících čeledí. Údaje byly nashromážděny během období od r. 1959 až 1993 ze 47 slovenských lokalit, znázorněných na přiložené mapce. 55 druhů tvoří součást moderního červeného seznamu araneofauny Slovenska.

PODĚKOVÁNÍ

Za mnohé cenné exempláře pavouků ulovených na území Slovenska děkuji především paní technické asistentce katedry E. Laštovkové (1942-1988). Dále tak s velikou radostí činím paní RNDr. J. Vilimové a pánům RNDr. S. Bílému, Mgr. J. Kociánovi, Ing. M. Kunertovi, Doc. RNDr. M. Kunstovi (1923-1987), RNDr. O. Hovorkovi, Prof. RNDr. K. Hůrkovi, gymn. prof. J. Martinkovi (1918-1968), posluchači PFF UK Z. Palicovi, RNDr. O. Pultarovi, Doc. RNDr. J. Štusákovi (1932-1994), Prof. RNDr. P. Štysovi, RNDr. P. Vernerovi, Doc. RNDr. J. Žďárkovi.

LITERATURA

- GAJDOŠ, P., SLOBODA, K., 1995: Utilizing of data spider occurrence in Slovakia in the field of landscape ecology. Proc. 15th Europ. Colloq. Arachnology in České Budějovice, s. 218.
 GAJDOŠ, P., SVATONĚ, J., 1993: The red list of spiders of Slovakia. *Boll. Acc. Gioenia Sci. Nat.*, 26: 115-133.



Obr. 1: Mapa Slovenska se sítí DFS, do níž jsou vepsána pořadová čísla lokalit blíže charakterizovaných v kapitole Materiál a metodika.

Pic. 1: Map of Slovakia by DFS, where the localities being described in Methods are shown. 75