

ZOOLOGICKÝ ÚSTAV
VYSOKÉ ŠKOLY ZEMĚDĚLSKÉ V BRNĚ.

Věda přírodní

Oddíl C: Ročník 14.

knihovna Číslo 7.

Strana 219-220

Praha 10. července 1933

Inv. č.: 04344

Položka:

20. 7. 1933.

Fager

inice, 20. 7. 33.

*Slovenským měm někdy, vědci tel. post. v Hronu
ynke' maly' faun. del. m. se list. stane v Hronu.*

sv. 6. 5. 33. Kuo ho chm' l

Nový rod sekáčů ze Slovenska.

V posledním čísle časopisu »Zoologischer Anzeiger« Bd. 102., Heft 11.-12. podává Dr. G. VON KOLOSVÁRY zprávu o novém rodu sekáčů *Roeweriolus hungaricus* n. g. n. sp., jež našel i na Slovensku u vesničky Jálňa, vzdálené asi 5 km od železniční stanice Hronská Brežnica v údolí Hronu. Jelikož nález ten obohacuje zvířenu naší vlasti o zvíře po mnoha stránkách velmi zajímavé, považují za svou povinnost upozorniti na ně širší naši veřejnost, aby byl hlášen případný nález jeho dosud neznámého samce.

Roeweriolus hungaricus je zástupce podčeledi *Sclerosomatinae* a žije v nejnižších místech vlhkých údolí. KOLOSVÁRY jej považuje za formu velmi starou a za endemita předhůří vnitřního oblouku Karpat, jež nebyla zatopena při záplavě pannonské pánve v mladší třetihorní době. Dle

této domněnky, již mi sdělil autor v dopise, musíme považovati druh *R. hungaricus* KOL. za relikť tehdejší zvířeny. Dle mého úsudku je tato domněnka oprávněná, neboť máme pro ni řadu důkazů i z řádu sekáčů (na př. z čeledi *Phalangodidae*), pavouků (z čeledi *Nesticidae*, *Linyphiidae*) a j. Sekáči podčeledi *Sclerosomatinae* jsou formy středomořské, zastoupené nyní 9 rody. Kromě rodu *Roeweriolus* zasahuje do střední Evropy pouze rod *Homalonotus* a to jen několika málo druhy.

R. hungaricus je asi 4 mm dlouhý; délka noh je 6, 13, 6, 9 mm. Z nejnápadnějších znaků uvádím pouze výskyt 1 páru růžkovitých a kratičkým ostnem ozbrojených výběžků nad klepýtky (chelicerami), ale pod čelní hranou hrudního štítu. Tyto jsou velmi význačné pro tento rod, neboť u ostatních rodů této podčeledi chybějí.

Dr. J. KRATOCHVIL, Brno.